

ಜನವರಿ, 2017 - ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು

- ❖ ತಾಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಸಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ತಾಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಾಶಕಗಳಾದ 2.4-ಡಿ ಮತ್ತು 2.4.5-ಟಿ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಸಂಚಿ ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳ ಗರಿಗಳ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿ ಹುಳುಗಳ ಗೂಡುಗಳು ನೇಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಹವಳಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡಬೇಕು. ಮೋನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ನ್ನು (10 ಮಿ.ಲೀ) 10 ಮಿ.ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
- ❖ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಿತಿರುವ ಗರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 10 ಮಿ.ಲೀ. ಮೋನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ನ್ನು 10 ಮಿ.ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ 2 ಮಿ.ಲೀ ಮೇಲಾತಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿನಾಲ್ಫಾಸ್ ನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು.
- ❖ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ೪೯ ಕೆ.ಜಿ ಯೂರಿಯಾ, ೭೧ ಕೆ ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ೩೮ ಕೆ.ಜಿ. ಮೂರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಷ್ ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೭ ಕೆ.ಜಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ❖ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ೯೯ ಕೆ.ಜಿ ಯೂರಿಯಾ, ೧೪೧ ಕೆ ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ೭೬ ಕೆ.ಜಿ. ಮೂರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಷ್ ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೧೪ ಕೆ.ಜಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ❖ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ೧೪೮ ಕೆ.ಜಿ ಯೂರಿಯಾ, ೧೧೩ ಕೆ ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ೧೧೪ ಕೆ.ಜಿ. ಮೂರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಷ್ ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೧೮ ಕೆ.ಜಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.