

ஜனவரி, 2017 – எண்ணெய் பனை சாகுபடிக்கான ஆலோசனைகள்

- ❖ எண்ணெய்ப்பனைத் தோட்டங்களில், 2,4-D, 2,4,5-T மற்றும் தாமிரம் சார்ந்த களைக்கொல்லிகளை அறவே தவிர்க்க வேண்டும். ஏனென்றால், எண்ணெய்ப்பனையின் வளர்ச்சிக்கு இவை ஆபத்தான விளைவுகளை உண்டாக்கும்.
- ❖ எண்ணெய்ப்பனைத் தோட்டங்களில், இல்லைக்கூட்டுப் புழுக்கள் (இலைகளின் அடிப்பகுதியில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும்) இலைகளை தின்று சேதப்படுத்தும். இதை கட்டுப்படுத்த, பாதிக்கப்பட்ட இலைகளை வெட்டி அப்புறப்படுத்த வேண்டும், 10 மில்லி மோனோகுரோட்டோபாசை 10 மில்லி நீரில் கலந்து வேர் மூலம் செலுத்தலாம்.
- ❖ எண்ணெய்ப்பனைத் தோட்டங்களில், இலைகளை தின்னும் கம்பளிப் பூச்சிகளை (பெரும்பாலும் இலைகளின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும்) கட்டுப்படுத்த, 10 மில்லி மோனோகுரோட்டோபாசை 10 மில்லி நீரில் கலந்து வேர் மூலம் செலுத்தலாம் (அ) மலத்தியான் / குயினால்பாஸ் 2 மில்லி யை 1 லி நீரில் கலந்து பனையின் அடிப்பகுதியை நனைத்து விடலாம்.
- ❖ எண்ணெய்ப்பனையில், முதல் ஆண்டில் ஏக்கருக்கு 49 கி யூரியா, 71 கி சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பெட் , 38 கி மியூரடே ஆப் பொட்டாஷ் யை

4 தவணைகளிலும், 7 கி மக்னீசியம் சல்பேட யை 2 தவணைகளிலும் ஒரு வருடத்திற்கு இட வேண்டும்.

❖ இரண்டாம் ஆண்டில் ஏக்கருக்கு 99 கி யூரியா, 142 கி சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பெட், 76 கி மியுரடே ஆப் பொட்டாஷ் ஐ 4 தவணைகளிலும், 14 கி மக்னீசியம் சல்பேட் ஐ 2 தவணைகளிலும் ஒரு வருடத்திற்கு இட வேண்டும்.

❖ மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ஏக்கருக்கு 148 கி யூரியா, 213 கி சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பெட் , 114 கி மியுரடே ஆப் பொட்டாஷ் ஐ 4 தவணைகளிலும், 28 கி மக்னீசியம் சல்பேட் ஐ 2 தவணைகளிலும் ஒவ்வொரு வருடமும் இட வேண்டும்.